

Алгоритм проведения процедуры педикюра при гипергидрозе стоп

№	Наименование средства	Кол-во, мл	Время выдержки/ обработки, мин.	Применение	Эффект
1	Жидкие перчатки	1,5	0,5	Нанести необходимое количество геля на кожу и втирать до полного впитывания.	Антисептика мастера перед началом процедуры.
2	Лосьон защитный Sanitar	2	0,5	Нанести средство на обрабатываемую поверхность рук/ног.	Антисептика клиента перед началом процедуры.
3	Кератолитик карбамидный профилактический	3	1-20 Нанести кератолитик и перейти к обработке ногтевой пластины и кутикулы	Нанести кератолитик карбамидный (pH = 7) на кожу стоп. Обработать разрыхленные участки кожи фрезой.	Безопасное размягчение/разрыхление огрубевших участков кожи для облегченного удаления.
4	Гель для удаления кутикулы classic	0,6	2-5	Нанести на кутикулу вокруг ногтевой пластины. Затем удалить ороговевшую часть кутикулы с помощью щипчиков или маникюрных ножниц.	Эффективное разрыхление и легкое удаление кутикулы.

5 Обработка стоп и ногтей

6	Лосьон подсушивающий при гипергидрозе	1,4	1-2	Нанести лосьон на чистую кожу каждой стопы. После нанесения – подсушить.	Лосьон оказывает подсушивающий, противовоспалительный, противобактериальный и противогрибковый эффекты.
7	Гель регенерирующий для ухода за кожей при гипергидрозе	2	1-2	Нанести необходимое количество геля на кожу и массировать до полного впитывания.	Подсушивание, смягчение и питание кожи стоп.
8	СЫВОРОТКА коллагеновая для поврежденных ногтей NEW NAILS	0,4	1-2	Тщательными и мягкими массажными движениями втирать сыворотку в ногтевую пластину, кутикулу и боковые валики.	Питание, увлажнение тканей кутикулы и ногтевых валиков, регенерация ногтевой пластины.
9	Присыпка для проблемных участков кожи плацентарная	0,5	1	Нанести необходимое количество средства в межпальцевую зону.	Снятие воспаления, регенерация, ускорение заживления мокнущих мозолей, ранок, трещин, повреждений, подсушивание кожи.
10	<p>Домашний уход:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лосьон подсушивающий при гипергидрозе (1 раз в день с утра); -Присыпка для проблемных участков кожи плацентарная (по мере необходимости). <p><i>Были произведены приблизительные расчеты на одну процедуру педикюра.</i></p>				